

Nouveau genre et nouvelle espèce de Diptères

(*Anæropsis* Lorquini),

Par M. JACQUES BIGOT.

(Séance du 28 Mars 1866.)

Caractères généraux des *Calobatidæ* (Mihi) (*Leptopodidæ*), facies des *Diopsidæ* (Mihi); tête arrondie, face à peu près plane, trois ocelles, front large, dilaté latéralement sous forme de deux longs prolongements cylindriques, divergents, relevés et oculifères, dépassant la moitié de la longueur de l'insecte, ouverture buccale munie en dehors d'un rebord saillant. Antennes inclinées sur le front et portées, chacune, sur une légère saillie conoïde; 3^e article un peu plus long que les deux précédents réunis, oblong, arrondi au bout; style basilaire légèrement villeux; palpes saillants, cylindriques, terminés par une soie. Trompe épaisse. Thorax rétréci en avant, col assez long, quelques soies rigides au bord du disque en arrière; écusson portant deux soies rigides à son sommet. Abdomen allongé, cylindrique, un peu renflé au bout. Pieds allongés, inermes; ongles et pelotes peu distincts. Ailes ovales, allongées, atteignant l'extrémité de l'abdomen. Nervation alaire presque semblable à celle des *Calobatis*, c'est-à-dire nervures *marginales* dépassant l'extrémité de l'aile et se terminant au bout de la troisième *longitudinale*. Première *longitudinale* fort courte; deuxième *id.* atteignant presque l'extrémité. Première nervure *transversale* droite, située vers le tiers antérieur de la précédente; deuxième *transversale* droite, placée vers le tiers postérieur de la quatrième *longitudinale* et formant une cellule *basilaire* appendiculée au coude, appendices joignant le bord de l'aile. Cellule *anale* courte, fermée à angle aigu, appendiculée au sommet; appendice courbe atteignant le bord de l'aile.

ANÆROPSIS LORQUINI.

Long. 14 mill.

Nigro brunneo, thoracis dorso parum nitido. Abdomine nigro brunneo. Capite fulvo, fronte brunnea pediculis oculiferis nigro-brunneis, basi fulvis. Antennis brunneis, palpis oreque fulvis. Pedibus anterioribus brunneis, femoribus basi fulvis, tibiis apice tarsisque basi, albidis. Intermedii desunt?... Posterioribus fulvis, genubus, tibiis tarsisque nigro brunneis. Alis brunnescentibus, maculis margineque interno albidis. Halteribus pallidis.

Brun noirâtre foncé, thorax un peu luisant, abdomen moins foncé ; tête fauve, front brun, palpes et trompe de même couleur, pédoncules oculifères noirâtres, à base fauve. Antennes brunes. Balanciers blanchâtres. Pieds antérieurs noirâtres, base et dessous des cuisses fauves, extrémité des tibias et base des tarses blancs. Pieds intermédiaires manquants?... Pieds postérieurs fauves, extrémité des cuisses, base et extrémité des tibias, tarses presque tout entiers, noirâtres. Ailes brunâtres, avec macules carrées ou allongées, bords postérieurs internes, blanchâtres.

Dédié à M. Lorquin, qui l'a rapporté des îles Moluques (*Waigiou*).

NOTA. Les deux exemplaires que je possède ayant été desséchés dans des papillotes de papier, et comprimés, ont les pédoncules oculifères presque accolés, relevés, perpendiculaires et presque parallèles. En est-il de même chez l'insecte à l'état frais ?

